



**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA FACULTAD  
DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD**

**CARRERA DE ENFERMERÍA**

**TÍTULO DEL TEMA:**

**FACTORES SOCIALES QUE INCIDEN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN  
ADOLESCENTE GESTANTES CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL VENUS  
DE VALDIVIA 2020**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  
LICENCIADA EN ENFERMERÍA.**

**AUTORA:**

**YAGUAL LINO MARLENE DE LOS ANGELES**

**TUTORA:**

**LIC. NANCY MARGARITA DOMIGUEZ RODRIGUEZ MSc.**

**PERIODO ACADÉMICO**

**2020-2**

## TRIBUNAL DE GRADO



Firmado electrónicamente por:  
**MILTON MARCOS  
GONZALEZ SANTOS**

---

Lic. Milton Gonzales Santos, Mgt  
**DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS  
SOCIALES Y DE LA SALUD**

---

Lcda. Alicia Cercado Mancero, PhD  
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE  
ENFERMERÍA**

---

Ing. Juan Enrique Fariño Cortez, PhD  
**DOCENTE DE ÁREA**

---

Lic. Nancy Domínguez Rodríguez, Msc  
**TUTORA**

---

Ab. Víctor Coronel Ortiz, Mgt  
**SECRETARIO GENERAL**

## **APROBACIÓN DEL TUTOR**

En mi calidad de tutora de proyecto de investigación: FACTORES SOCIALES QUE INCÍDEN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTE GESTANTES CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL VENUS DE VALDIVIA 2020, elaborada por la Sra. YAGUAL LINO MARLENE DE LOS ANGELES, estudiante de la CARRERA DE ENFERMERÍA. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD, perteneciente a la UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA, previo a la obtención del título de LICENCIADA EN ENFERMERÍA, me permito a declarar que luego de haber orientado y estudiado y revisado, lo APRUEBO en todas sus partes.

**Atentamente**



Lic. Nancy Domínguez R. Mastel  
DOCENTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA

Lcda. Nancy Margarita Domínguez Rodríguez MSc.  
TUTORA

## DEDICATORIA

El actual proyecto de investigación se lo dedico a Dios por ser mi fortaleza y por permitirme llegar a este proceso de obtener tan anhelada meta de ser una profesional de la salud.

A mis padres por haberme brindado su amor, dedicación y los recursos necesarios que me sirvieron para poder terminar mis estudios, a mi hija que ha sido para mí el motor principal que ha podido hacer esto posible.

A mi esposo por siempre brindarme su apoyo incondicional y consejos en situaciones difíciles, el cual fue de mucha ayuda para lograr mis metas propuestas.

A mis docentes y tutora, por toda la paciencia y dedicación que tuvo conmigo en todo el proceso del estudio de caso siempre fomentando el sentido de la responsabilidad para concluir con éxito mi carrera, gracias a ellos he llegado al final de este andar que ha sido largo, pero no difícil de cumplirlo.

*Yagual Lino Marlene de los Ángeles*

## AGRADECIMIENTO

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer a todas aquellas personas que me han ayudado y brindado su apoyo a lo largo de estos años de arduo andar por la Universidad Estatal Península de Santa Elena.

A mi familia por el gran apoyo incondicional y desinteresado brindado desde el comienzo de mis estudios, demostrándome empatía y fortaleza ante las adversidades que pudiera presentar inculcando valores, respeto y sobre todo engrandeciendo la paciencia hacia lo que me tocaba cumplir para así brindar amor a todo el que estuviera a mi cuidado.

Muy especial a mi hija, porque ella más que nadie sentirá orgullo, y aunque aún es muy pequeña para comprender lo que hago es por ella y para ella es esta meta cumplida. Por lo que estoy segura que hoy y siempre sentirá orgullo de verme realizada.

A mis compañeras de clases y amigos, que han hecho de este largo camino un andar ameno con altas y bajas, pero siempre demostrando compañerismo y compromiso hacia nuestra formación. También a la Carrera de Enfermería que ha servido para formarme como licenciada y en ella he encontrado muchas cosas más, como es lo ético, lo moral y principalmente como ser humano integro, madurando y comprendiendo la esencia de la profesión.

*Yagual Lino Marlene de los Ángeles*

## DECLARACIÓN

El contenido del presente estudio de caso es de mi responsabilidad, el patrimonio intelectual del mismo pertenece a la Universidad Estatal Península de Santa Elena.

Marlene Yagual L.

Yagual Lino Marlene de los Ángeles

C.I. 0927515379

## RESUMEN

El consumo de drogas sigue siendo una problemática de salud que no tiene fin y cada año siguen aumentando las cifras en especial los adolescentes. Sin embargo, el consumo de drogas en el embarazo en adolescentes resulta ser un problema más difícil de resolver. El objetivo de este proyecto de investigación es determinar los factores de riesgo sociales que inciden en el consumo de drogas en adolescentes gestantes del Centro Materno Infantil Venus de Valdivia. Es un estudio de tipo descriptivo, con un enfoque cualitativo, con una muestra: constituido 63 adolescentes gestantes, los resultados obtenidos fueron, se pudo evidenciar que el rango de edad de 13 a 15 años es el que predominó con un 43% en cuanto al inicio de consumo de drogas en las adolescentes gestantes y en un menor porcentaje tenemos con un 21% adolescentes entre 10 a 12 años, El segundo objetivo planteado tenemos con un 33% a la depresión por relaciones sentimentales, con un 30% la mala relación con los padres, con un 21% la falta de interés de los padres por conocer el entorno que rodean a sus hijos. En relación al tercer objetivo planteado: 27% de deformidades en las extremidades, además la adolescente puede presentar; un 22% de desprendimiento de placenta y placenta previa, con el 21% anomalías del sistema nervioso central y periférico, el 17% retraso en el crecimiento intrauterino y en una menor cantidad con un 13% aborto espontáneo. En conclusión, se logró determinar que existen varios factores sociales que inciden en el consumo de drogas en adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia, dentro de los cuales se logró determinar los rangos de edad y tiempo de consumo de drogas, la mala relación con los padres y la depresión por relaciones sentimentales son los factores que más predominaron.

Palabras clave: factores sociales, consumo, drogas, adolescentes gestantes,

## ABSTRACT

Drug use continues to be a never-ending health problem and the numbers continue to increase every year, especially adolescents. However, drug use in teenage pregnancy turns out to be a more difficult problem to solve. The objective of this research project is to determine the social risk factors that affect drug use in pregnant adolescents at the Venus de Valdivia Maternal and Child Center. It is a descriptive study, with a qualitative approach, with a sample: consisting of 63 pregnant adolescents, the results obtained were, it was possible to show that the age range of 13 to 15 years is the one that predominated with 43% in terms of beginning of drug use in pregnant adolescents and in a lower percentage we have with 21% adolescents between 10 and 12 years old, the second objective we have with 33% depression due to romantic relationships, with 30% the bad relationship with the parents, with 21% the lack of interest of the parents to know the environment that surrounds their children. In relation to the third objective: 27% of deformities in the extremities, in addition the adolescent can present; 22% of placental abruption and placenta previous, 21% abnormalities of the central and peripheral nervous system, 17% delay in intrauterine growth and to a lesser extent with 13% spontaneous abortion. In conclusion, it was possible to determine that there are several social factors that affect drug use in pregnant adolescents at the Venus de Valdivia Health Center, within which it was possible to determine the age ranges and time of drug use, the bad relationship with parents and depression due to romantic relationships are the factors that predominated the most.

Keywords: social factors, consumption, drugs, pregnant adolescent.



## ÍNDICE GENERAL

TRIBUNAL DE GRADO .....	II
APROBACIÓN DEL TUTOR .....	III
DEDICATORIA .....	IV
AGRADECIMIENTO .....	V
DECLARACIÓN.....	VI
RESUMEN .....	VII
ABSTRACT.....	VIII
INTRODUCCIÓN .....	2
CAPITULO I .....	4
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	4
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .....	4
1.2 FORMULACIÓN DEL TEMA .....	6
2. OBJETIVOS .....	6
2.1 Objetivo General .....	6
2.2 Objetivos Específicos .....	6
3. JUSTIFICACIÓN .....	7
CAPITULO II.....	8
4. MARCO TEÓRICO .....	8
4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .....	8
4.2. Fundamentación Teórica.....	10
4.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL.....	16

4.4 FUNDAMENTACIÓN DE ENFERMERÍA.....	17
5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS.....	18
5.1. Identificar y clasificación de variables.....	18
5.2 Operacionalización de variables .....	18
CAPITULO III.....	21
6. DISEÑO METODOLÓGICO .....	21
6.1. Tipo de investigación .....	21
6.2. Métodos de investigación.....	21
6.3. Población y muestra .....	21
6.4. Tipos de muestreo .....	22
6.5 Técnicas recolección de datos.....	22
6.6. Instrumentos de recolección de datos .....	22
6.7. Aspectos éticos.....	23
CAPÍTULO IV .....	24
7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS .....	24
7.1 Análisis e interpretación de resultados.....	24
7.2 Conclusiones .....	31
7.3 Recomendaciones .....	32
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	33
9. ANEXOS .....	38
PERMISO DEL DISTRITO DE SALUD .....	38
ENCUESTA.....	41
TABLAS Y GRÁFICOS.....	46
FOTOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA CON LAS ADOLESCENTES GESTANTES .....	58

REPORTE URKUND .....61

## ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1 EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE DROGAS .....	24
TABLA 2 FRECUENCIA DE CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES .....	25
TABLA 3 EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA HA TENIDO DESEOS FUERTES O ANSIAS DE CONSUMIR .....	26
TABLA 4 EL FACTOR SOCIAL QUE MÁS INCIDE EN EL CONSUMO DE DROGAS.....	27
TABLA 5 FACTORES DE RIESGO QUE CONSIDERAS UD QUE INCIDEN EN EL CONSUMO DE DROGAS .....	28
TABLA 6 COMPLICACIONES MATERNO-FETALES.....	29
TABLA 7 CUÁL ES EL RIESGO QUE CORRE UNA PERSONA QUE CONSUME DROGAS.....	30

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1 EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE DROGAS .....	24
GRÁFICO 2 FRECUENCIA DE CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES.....	25
GRÁFICO 3 FRECUENCIA DE LOS DESEOS O ANSIAS POR CONSUMIR SUSTANCIAS TOXICAS TIENEN LAS ADOLESCENTES GESTANTES EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES .....	26
GRÁFICO 4 FACTOR SOCIAL QUE MÁS INCIDE EN EL CONSUMO DE DROGAS.....	27
GRÁFICO 5 FACTORES DE RIESGO QUE CONSIDERAS UD QUE INCIDEN EN EL CONSUMO DE DROGAS.....	28
GRÁFICO 6 COMPLICACIONES MATERNO-FETALES .....	29
GRÁFICO 7 CUÁL ES EL RIESGO QUE CORRE UNA PERSONA QUE CONSUME .....	30

## INTRODUCCIÓN

El consumo de drogas constituye una de las problemáticas más relevantes en el sector de salud pública, condicionado por factores de riesgo físicos, sociales, culturales y psicológicos; resultando ser de esta manera una de las mayores preocupaciones que afronta día a día la sociedad. Además, Tiene como resultado un alto grado de sufrimiento, incapacitación personal, morbi-mortalidad, gastos sociales y sanitarios. Siendo los adolescentes los más propensos a estar involucrados en esta problemática, incluso cobra más relevancia cuando los adolescentes son mujeres en estado de gestación, debido a que pueden afectar tanto al feto como a la madre y ambos podrían sufrir consecuencias graves en su salud incluso se podría llegar hasta la muerte.

La Organización Mundial de la Salud afirma que “el consumo de drogas son las causantes de más de 450.000 muertes al año, el 30% de esa cifra corresponde a drogas inyectables que a su vez desarrollan otras enfermedades como el VIH, la Hepatitis B y C” (Quizhpi, 2019). Al analizar los datos estadísticos podemos evidenciar que existe un alto índice de consumo de drogas a nivel de todo el mundo, por tal motivo se puede inferir que el consumo de drogas está directamente relacionado con el entorno social en que viven los adolescentes, la falta de educación, la falta de recursos entre otros factores de riesgo.

El consumo de drogas no solo depende del tipo de droga que consumen los adolescentes en estado de gestación, sino de los factores de riesgo que incitan a que estas puedan ser consumidas, entre ellos tenemos problemas familiares, personales, violencia intrafamiliar, falta de recursos económicos, entorno social donde viven y con quien comparten. “el uso de drogas en mujeres en su edad fértil, aumenta las posibilidades de contraer un embarazo y posterior a ello da inicio a las complicaciones materno fetales” (Acosta, 2017).

Las adolescentes gestantes y el consumo de drogas puede deberse a una etapa experimental u ocasional según los criterios de cada persona, a pesar de tener los conocimientos del problema que le pueden ocasionar a su salud y a la del bebe deciden realizarlo.

Las causas o factores que influyen en las mujeres para el consumo de estas sustancias adictivas son diferentes a la de los hombres, estudios revelan que las mujeres en estado de gestación tienen mayor susceptibilidad biológica para el alcohol así mismo una mayor comorbilidad médico-psiquiátrica, socio familiar y cultural es por eso que las drogas producen mayor daño y gravedad en el sexo femenino al momento de consumirlas o en su adicción.

En virtud de lo expuesto en el Centro Materno Infantil Venus de Valdivia, existe gran cantidad de adolescentes gestantes que acuden para realizarse sus chequeos mensuales, además se puede evidenciar que en algunos casos existes adolescentes que consumen drogas, conociendo toda esta problemática en cuanto a la drogodependencia en mujeres gestantes es importante plantearnos la siguiente interrogante; determinar cuáles son los factores sociales que inciden en el consumo de drogas en adolescentes gestantes Centro Materno Infantil Venus de Valdivia.

El objetivo de esta investigación es determinar los factores de riesgo sociales que inciden en el consumo de drogas en adolescentes gestantes del Centro Materno Infantil Venus de Valdivia. El Cantón de la Libertad tiene una gran incidencia de adolescentes que consumen drogas y esto afectan su calidad de vida por ello el Centro de Salud tiene un gran reto para reducir esta problemática en salud.

# CAPÍTULO I

## 1. Planteamiento del Problema

### 1.1 Descripción del problema

Los factores sociales según la Organización Mundial de la Salud ( O M S ) los define como "las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana" (OMS, 2018). Estas factoras tenemos: la educación, la vivienda, la salud, nivel económico y político.

El consumo de drogas, también se conoce como “trastorno por consumo de sustancias, es una enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento de una persona, y produce incapacidad de controlar el consumo de medicamentos o drogas legales o ilegales” (Mayo, 2020). Los adolescentes son quienes están más propensos al consumo de drogas y las que están embarazadas corren un riesgo mayor de peligro en su salud.

A nivel mundial en 2018, unos 35,6 millones de personas padecían trastornos por consumo de drogas. La pobreza, la educación limitada y la marginación social pueden aumentar el riesgo de trastornos por consumo de drogas y agravar sus consecuencias. Esto se confirma en estudios realizados en países de altos ingresos, donde la trayectoria socioeconómica adversa de una persona, no sólo su situación en un momento dado, también se vincula al riesgo de trastornos por consumo de drogas. (Waly, 2020).

Se puede analizar claramente la relación que tienes los factores de riesgo sociales con el consumo de drogas y más aún en mujeres en estado de gestación donde las complicaciones son más graves y mortales si no existe un control adecuado a este tipo de población.

En un estudio realizado en Uruguay y Argentina cerca de la mitad de las 1.512 mujeres embarazadas que concurrieron a control prenatal en 12 hospitales públicos habían sido o eran fumadoras (44% en Argentina y 53% en Uruguay). Durante el embarazo, el 11% de las mujeres en Argentina y el 18% en Uruguay continuaron fumando. (Diez & Pawlowicz, 2020).



Es decir, que a pesar de tener conocimiento acerca de las consecuencias que genera el consumo de drogas, tanto en la madre como en el feto, las adolescentes lo siguen realizando, motivo por el cual seguirá habiendo embarazos de riesgo, y es aquí donde se debería hacer énfasis para tratar de resolver esta problemática de salud.

En Ecuador según la Secretaria Técnica de Prevención Integral de Drogas (SETED) señala que de acuerdo con las estadísticas de la Encuesta sobre uso y consumo de drogas ilícitas en estudiantes de enseñanza media, los datos estadísticos que inciden en el consumo de drogas reflejan que existe gran cantidad de adolescentes consumen alguna sustancia psicotrópica, lo que nos indica que existe una problemática social, debido a que los adolescentes en este estado no miden las consecuencias y las mujeres en especial terminan teniendo relaciones sexuales sin protección, dando como resultado después un embarazo no deseado. (Murillo, 2019).

En la provincia de Santa Elena datos estadísticos expuestos por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en el 2013, señala: “La Provincia de Santa Elena el 48,10 % de la población estudiantil tiene un gran riesgo de ingerir bebidas alcohólicas, cigarrillo 48,10% y el acceso a drogas, como la marihuana, alcanza el 55,40% la y cocaína 55,30%” (Welintong, 2017). A pesar de haberse establecido varias medidas de prohibición y políticas que impiden su venta, es necesario determinar los factores de riesgo personal, familiar, social, y cultural la forma en que influyen de manera negativa en esta etapa de vulnerabilidad.

Si bien existe un mayor conocimiento sobre su forma de consumo, aún la percepción social de la mujer adicta transporta consigo un estigma más marcado.

En el Centro de Salud Venus de Valdivia se ha evidenciado que acuden a consulta médica adolescentes embarazadas dentro de las cuales se puede observar que tienen facies y comportamiento inadecuados, producto del consumo de drogas dicho por los familiares de las pacientes, debido a esto se puede identificar claramente la problemática que existe en el Centro de Salud, por tal motivo se decide realizar el proyecto de investigación con el objetivo de determinar los factores sociales que inciden en el consumo de drogas en adolescentes embarazadas, además con la base de datos vamos a verificar la población de mujeres que consume droga durante su embarazo en el Centro de Salud Materno Infantil Venus de Valdivia.

## **1.2 Formulación del Tema**

¿Cuáles son los factores sociales que inciden en las adolescentes gestantes para que consuman droga Centro Materno Infantil Venus de Valdivia 2020?

## **2. Objetivos**

### **2.1 Objetivo General**

Determinar los factores sociales que inciden en el consumo de drogas en adolescentes gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Venus de Valdivia 2020.

### **2.2 Objetivos Específicos**

- Caracterizar la población de adolescentes gestantes que consumen drogas según rangos de edad y tiempo de consumo
- Identificar los factores de riesgo sociales que más inciden en el consumo de drogas en las adolescentes gestantes del Centro de Salud
- Relacionar factores de riesgo sociales por consumo de drogas con las complicaciones materno fetales que presentan las adolescentes gestantes del Centro de Salud.

### **3. Justificación**

El desconocimiento de los factores de riesgos sociales que inciden en el consumo de drogas en adolescentes gestantes, resulta un problema evidente que se manifiesta en el Centro Materno Infantil Venus de Valdivia, por eso es necesaria la intervención de enfermería, para capacitar a los adolescentes y más aún a las embarazadas sobre la forma correcta de cómo prevenir y detectar a tiempo enfermedades que podrían afectar su salud.

Este proyecto de investigación justifica su realización debido a la importancia que radica en tratar de dar soluciones a esta problemática de salud sobre el consumo de drogas que cada vez va involucrando más individuos a este vicio, y en relación al problema que presentan las adolescentes gestantes cobra mucha importancia aun ya que se identificara cuáles son los factores de riesgo sociales que inciden a que las adolescentes gestantes consuman drogas.

Con este proyecto de investigación vamos a beneficiar tanto al Centro de Salud como a las adolescentes gestantes ya que implementaremos actividades de enfermería que permitan reducir el consumo de drogas en las adolescentes y a su vez ayudarlos en su recuperación mediante consejería y la orientación de enfermería para poder llevar un buen autocuidado en ellas.

Además, esta investigación beneficiara a la universidad y al estudiante ya que fomenta la investigación científica, y aumenta el conocimiento y experiencia en el estudiante, aportes instructivos que le sirven de mucho para crecer en su vida profesional.

## **CAPÍTULO II**

### **4. Marco Teórico**

#### **4.1 Antecedentes de la investigación**

En un estudio acerca de factores de riesgos asociados al consumo de drogas ilícitas por adolescentes embarazadas de 14-19 años de edad en el hospital Dra. Matilde Hidalgo de Prócel, se ha logrado determinar que de entre los factores asociados con el consumo de drogas en adolescentes embarazadas tenemos:

Una de las causas principales es la temprana edad con que inician en el consumo de drogas, con un 33% donde las adolescentes iniciaron a consumir droga a la de edad de 15 años seguido del 29% a los 14 años. Otro de los factores de riesgo que permite inferir que la causa que motivó el consumo de drogas por parte de las adolescentes está los hogares disfuncionales en un 47%, seguido de curiosidad con un 38%. Para determinar las variables sociodemográficas-culturales y su relación con el consumo de drogas, donde se puede inferir que en un 57% las adolescentes embarazadas son Estudiantes, en un 33% son Ama de Casa, y tan solo en un 10% trabaja. (Samaniego, 2017).

Esta investigación nos pone en consideración poder inferir cuales de los factores sociales son los que más inciden en el consumo de drogas en adolescentes gestantes, y nos menciona que es la edad de consumo que impacta más en este estudio donde a los 14 años las adolescentes empiezan a consumir drogas a causa de problemas en el hogar por tener familias disfuncionales, motivo por el cual nos lleva a la conclusión de que hay que poner mucha atención en esta etapa de la vida porque es ahí cuando las adolescentes tienen a cometer errores y quedan embarazadas, ya que por el efecto de las drogas tienden a tener relaciones sexuales sin protección.

Los resultados del presente trabajo de titulación sobre embarazo en mujeres consumidoras de drogas del Hospital Universitario de Guayaquil reportaron que las personas que están en el grupo etario de entre 16 y 20 años, son las personas con mayor prevalencia de consumo de drogas.

De 120 pacientes que presentaron factores de riesgo, un 35 % se debe a la falta de supervisión de los padres, el 31 % presentó complicaciones como el parto pre término con una proporción de 36%, seguido de aborto con 26 %, pérdida de peso con

20 %, enfermedades de transmisión sexual con 11 %, depresión con 5 % y otros trastornos múltiples con el 2 %. (López, 2017).

Este estudio nos revela que la falta de supervisión de los padres hacia los hijos es uno de los principales factores de riesgo para que ellos caigan en el mundo de las drogas y más aún si están embarazadas y entran en estado depresivo tienden a consumir drogas sin medir las complicaciones para su hijo.

El consumo de sustancias psicoactivas durante el embarazo no es un fenómeno aislado, está relacionado con el entorno cultural y social: con él se combinan otras circunstancias adversas como pobreza, discriminación, abandono educativo, falta de empleo, violencia interpersonal, desintegración familiar, antecedentes de abuso –físico y sexual– y, en general, un inadecuado cuidado de la salud (López & Cruz, 2018).

## **4.2. Fundamentación Teórica**

### **4.2.1 El consumo de drogas**

El consumo de drogas es uno de los problemas sociales con mayor trascendencia en la humanidad, en los últimos años se ha convertido en un tema de preocupación para los organismos y autoridades nacionales e internacionales por las repercusiones en el estado de salud de las personas, “La droga es una sustancia natural o sintética cuyo consumo puede generar adicción, dependencia, cambios en la conducta, alejamiento de la percepción de la realidad o disminución de la capacidad cognitiva, así como efectos perjudiciales para la salud” (Salud, 2019).

### **4.2.2 Factores de riesgo**

Los problemas de drogas también afectan factores individuales y sociales; donde también pueden influir problemas personales, trastornos mentales, sociedades, maltrato y el declive económico. “El consumo de drogas en su edad fértil, aumentado las posibilidades de contraer un embarazo, posterior a ello pueden existir complicaciones materno-fetales” (Acosta, 2017).

Los factores de riesgo siguen siendo la principal causa para que los individuos entren al mundo de las drogas ya que se ha comprobado en estudios científicos que los factores del entorno social y cultural están estrechamente relacionadas con el consumo de drogas.

### **4.2.3 Adicción**

La adicción se considera una enfermedad ocasionada por el consumo de drogas durante un periodo de tiempo relativamente largo, que causa daños en la salud de la persona tanto físicos, biológicos y psicológicos, tanto al consumidor como a la familia.

La adicción se la define como una enfermedad, porque el abuso de sustancias o conductas compulsivas modifica la estructura y el funcionamiento del cerebro. Se ha comprobado que la adicción no solo ocasiona muertes en el consumidor sino también en los miembros de la familia (Recal, 2018).

#### **4.2.4 Adolescencia**

La adolescencia es el período de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la que un joven se relaciona con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad tanto a los niños como a sus familias. Entender qué se puede esperar en las distintas etapas puede promover un desarrollo saludable durante toda la adolescencia y a principios de la adultez (Allen, 2019).

Adolescencia Es la etapa de vida de todo ser humano, la cual cumple dos periodos importantes: infancia y pubertad. Durante esa etapa se presenta diversos cambios a nivel externo (físico) aparato reproductor y psicológico, como también alteraciones en el comportamiento o actitud.

#### **4.2.5 Drogadicción**

“la drogadicción se la define como el consumo de sustancias psicoactiva, que causan daños a la salud el individuo a nivel del encéfalo, a nivel conductual, psicológico, social, económico y cultural” (Clinic, 2018).

Hoy en día la drogadicción más que un problema social se ha convertido en una problemática de salud ya que son tantos los caso que se escuchan de personas consumidoras que acuden a los Centros de Salud, y solo cuando ya se ven afectados en su salud y no saben qué hacer buscan ayuda.

#### **4.2.6 Tipos de drogas**

Los tipos de drogas se clasifican según: sus vías de consumo, según sus efectos sobre el sistema nervioso. Según su vía de consumo: Tenemos, marihuana, heroína, crack, cocaína alcohol

Según su efecto sobre el sistema nervioso tenemos: Depresoras del sistema nervioso Alcohol, Hipnóticos: pastillas para conciliar el sueño y barbitúricos, Ansiolíticos: benzodicepinas, Opiáceos: heroína, morfina, codeína y metadona.

#### **4.2.7 Tabaquismo**

La Organización Mundial de la Salud define al tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica que evoluciona con recaídas. La nicotina provoca adicción debido a que actúa a nivel del sistema nervioso central “Es más adictivas que la cocaína y la heroína, aunque el 70% de los fumadores quieren dejar de fumar, sólo el 3% por año lo logran” (OMS, 2018).

El tabaquismo al igual que las drogas son problemas sociales que involucran a los individuos al mundo de la adicción, la diferencia radica en que las drogas producen más daños al organismo y con consecuencias mortales.

#### **4.2.8 Complicaciones maternas**

Complicaciones maternas agudas Problema de salud que ocurre durante el periodo de gestación, que pueden estar relacionadas al consumo pero que no se vinculan estrictamente con el mecanismo de acción tóxica de la sustancia, interviniendo factores dependientes de la persona y del entorno.

En relación con los factores socioeconómicos, estas mujeres embarazadas padecen desnutrición, inestabilidad económica y son víctimas de violencia. Además, los profesionales de la salud manifiestan que las gestantes no buscan atención prenatal ni asistencia sanitaria. Otras consecuencias del abuso de esta sustancia durante el embarazo: ruptura prematura de membranas o RPMO (entre el 2% al 46% presentan RPMO), amenaza de parto prematuro, depresión, riesgo de enfermedad cerebrovascular hemorrágica e isquémica y desprendimiento de placenta<sup>23,24</sup>. También se asocia con hipermetabolismo, infiltraciones pulmonares y aumento de infecciones como la pielonefritis (Londoño, 2016).

#### **4.2.3 Factores Psicosociales**

Factores Psicosociales: son indicadores de carácter psicológico y social que permite develar en entorno en el que vive el individuo, cuya presencia o ausencia afecta la conducta, su forma de ser, su forma de ver las cosas a tal punto que pierde la noción de las cosas que realiza.



#### **4.2.3.1 Embarazo en la adolescente:**

Es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente, entre la adolescencia inicial o pubertad que es el comienzo de la edad fértil y el final de la adolescencia, que no han alcanzado la mayoría de edad y que están en situación de dependencia de la familia de origen.

#### **4.2.3.2 Factores de riesgo asociados a embarazo en adolescentes:**

Individuales: rendimiento académico de bajo nivel, ideas de grandeza y superioridad, falta de conocimientos acerca de planificación familiar, desilusiones en relaciones sentimentales de los adolescentes.

Familiares: Disfuncionalidad familiar, madre o hermana con antecedentes de embarazo en su adolescencia, pérdida de familiares cercanos representativos o figuras representativas y bajo nivel de educación de los padres.

Sociales: Nivel socio económico bajo, vivienda con hacinamiento, malas condiciones de la vivienda, eventos antisociales en el área de la vivienda: delincuencia, drogadicción, prostitución, alcoholismo, explotación laboral, estrés, vivienda en área rural, empleo precoz, transferencia de conocimientos ancestrales y generacionales sobre sexualidad retrógrados. El embarazo en la adolescencia podría ser un mecanismo producto de la pobreza hereditaria.

Las mujeres embarazadas, en particular las adolescentes, pueden estar expuestas a la violencia, la discriminación en el lugar de trabajo y en la escuela o la marginación. Estos problemas deben controlarse también, aunque no sólo, introduciendo mejoras en los entornos sociales, políticos y jurídicos.

#### **4.2.3.3 Factores familiares que influyen en el consumo de drogas**

El consumo de estupefacientes a nivel mundial se ha vuelto en la actualidad un problema a gran escala, la aparición de nuevas drogas y de mecanismos para transportarla, han generado que el consumo y contrabando vaya en aumento, sumados al creciente índice de muertes por sobredosis, lo cual constituye al problema del consumo de sustancias un punto importante a tratar en el mundo entero. Existen diversos factores a los que se le atribuye una gran influencia en el consumo de sustancias psicotrópicas, entre los cuales están los siguientes:

Falta de comunicación y carencia familiar. Muchos padres suelen convertirse en meros proveedores de alimentos y recursos, dejando la parte afectiva y emocional de lado, es común identificar en personas que han caído en el consumo de drogas la falta de afecto y comunicación familiar como uno de los principales motivos e indicadores de esta problemática.

Es indiscutible que la influencia de los padres en la adolescencia es significativa debido a que los hijos conservan los lazos afectivos importantes con ellos y continúan siendo una de sus principales fuentes de apego y ayuda emocional, ya que la relación afectiva sana, sin duda puede proteger a los adolescentes del consumo de sustancias (Ventura, Castro, & Carrera, 2017).

Familias disfuncionales severas Existen factores dentro de la familia que terminan volviendo más vulnerable al individuo frente a la posibilidad de consumo, entre esos se cuenta la disfuncionalidad familiar, el no desarrollarse en un contexto completo con roles claros y definidos, deja a la persona más expuesta frente al gran problema de las drogas. Las relaciones familiares se encuentran dentro del grupo de factores de riesgo externos.

En el ámbito familiar, el maltrato, la violencia, la mala comunicación dañan la salud de los adolescentes y su estilo de vida (Barrios & Verdecia, 2016).

Falta de normas y límites dentro del hogar: Las normas siempre han sido necesarias en el contexto social para establecer límites de comportamiento y generar una sana convivencia, y aunque son establecidas por agentes externos, su principal objetivo es precautelar la integridad personal. Desde el hogar se establecen los primeros lineamientos que permitirán al individuo a actuar de manera sana para el cuidado individual y una correcta inserción social.

Acorde a lo ya señalado por Betancourt y Andrade, la asociación entre el control conductual y los problemas en la adolescencia muestran una relación negativa entre estas variables, es decir, que un pobre control conductual, específicamente de la madre, se asocia con un mayor número de problemas, incluido el consumo de sustancias psicoactivas (Moreno & Palomar, 2017).

#### **4.2.3.4 Condiciones socioeconómicas**

El factor económico es uno de los principales factores relacionados con el consumo de drogas en las adolescentes. Igualmente, lugar donde viven, los ambientes deteriorados, las elevadas tasas de delincuencia, llevan a las personas a involucrarse en el mundo de las drogas.

Los problemas socio-económicos como: el endeudamiento, problemas de subsistencia y sustitución de otros bienes más importantes por las drogas, por este motivo los jóvenes terminan incluso viéndose obligados a robar para poder mantener el consumo (Betanco, 2017).

#### **4.2.3.5 Estilo de vida**

Estas condiciones de vida son producto de las circunstancias sociales, económicas y del entorno físico, todo lo cual puede ejercer impacto en la salud. El estilo de vida de las adolescentes embarazadas hoy en la actualidad a cambiado mucho ya que ahora las adolescentes tienen más libertad para salir, acudir a fiestas y estar en un vínculo social a su conveniencia es decir según la moda o el impacto social que este en el momento, todos estos factores son causantes de muchas adicciones desde temprana edad ya que el alcohol y las drogas están presentes en todo lugar.

### 4.3 Fundamentación legal

#### Constitución de la República del Ecuador 2008

En su artículo 32 menciona, que la salud es un derecho que garantiza el Estado y que esta ejecución está vinculada con otros derechos como; el derecho al agua, la educación, el trabajo, la vivienda entre otros. Los servicios de salud serán regulados por los principios de igualdad, solidaridad, interculturalismo, beneficencia y no mal eficiencia, códigos de ética y bioética.

Constitución de la República del Ecuador, menciona en su artículo 35 que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Ley Orgánica de Salud. Capítulo II: de la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades. Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, bebidas alcohólicas, y otras sustancias que afectan la salud. 17 22. Regular, controlar o prohibir en casos necesarios, en coordinación con otros organismos competentes, la producción, importación, comercialización, publicidad y uso de sustancias tóxicas o peligrosas que constituyan riesgo para la salud de las personas. (Ley, 2018).

#### **4.4 Fundamentación de enfermería**

Teoría de Nola Pender y su Modelo de Promoción de la Salud La importancia que tiene a prevención y promoción en salud por tratar de cambiar los hábitos poco saludables en la población, disminuir sus factores de riesgo y la aparición de enfermedades Nola Pender en su modelo de Promoción de la Salud, Identifica en el individuo factores cognitivo-perceptuales que son características que pueden ser manejables y modificables para promover la práctica de conductas que beneficien la salud.

Esta teoría de la promoción de la salud se relaciona con el tema de estudio porque trata de identificar en el individuo factores de riesgo que pueden poner en peligro la salud de las adolescentes gestantes ya que estas conductas son manejables y modificables, también en la investigación se caracterizara a la población de gestantes adolescentes que consuman drogas por rangos de edad lo que nos permitirá analizar en qué edades es que se producen más estos casos y bajo qué factores de riesgo se producen por ello es importante saber el estilo de vida y como se relacionan en el entorno donde viven o frecuentan para poder determinar cuál es el factor de riesgo que más incide en el consumo de drogas en las adolescentes gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Venus de Valdivia.

El modelo de autocuidado de Dorothea Orem permite al individuo fomentar y llevar una vida saludable, por tal razón el individuo adquiere conocimientos teóricos y prácticos de cómo prevenir enfermedades a futuro. El término denominado agencia de cuidados por Dorothea Orem, identifica que la compleja capacidad desarrollada para que los individuos puedan controlar, regular y decidir sobre su salud y bienestar es la principal causa, para que los individuos descuiden su autocuidado y por ende aumenten los factores de riesgo para contraer enfermedades (Cochea & Cevallos, 2019, pág. 21).

Por eso es necesario identificar la población de gestantes adolescentes que están consumiendo drogas e identificar qué factores sociales están causando este problema de salud y de esta forma buscar una solución para poder orientarlas mediante una buena y correcta promoción de salud para hacerles entender que el consumo de drogas es perjudicial para su salud y la del feto y hacer que poco a poco dejen de ser consumidoras y puedan estar en tratamiento psicológico y nutricional.

## **5. Formulación de la hipótesis**

Los factores sociales inciden en el consumo de drogas en adolescente gestantes del Centro Materno Infantil Venus de Valdivia.

### **5.1. Identificar y clasificación de variables**

#### **Variable dependiente**

Consumo de drogas

- Tiempo de consumo
- Edad que empezó a consumir drogas
- Tipo de drogas que consume

#### **Variables independientes**

Factores sociales

- Condiciones socioeconómicas
- Estilo de vida
- Educación
- Relaciones sociales
- Violencia

## 5.2 Operacionalización de variables

HIPÓTESIS	VARIABLE	DEFINICIÓN		
		CONCEPTUAL	DIMENSION	INDICADOR
DEFINICIÓN OPERACIONAL				
TÉCNICAS				
¿Los factores sociales inciden en el consumo de drogas en adolescente gestantes del Centro Materno Infantil Venus de Valdivia?	Consumo de drogas	Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) droga es "toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones"	Tiempo de consumo	1 a 3 años 4 a 5 años 6 a 10 años
			Edad que empezó a consumir drogas	Encuesta 10-13 años 14-15 años 16-19 año
			Tipo de droga que consume	heroína marihuana cocaína

Elaborado por: Yagual Lino Marlene de los Ángeles

HIPÓTESIS	VARIABLE	DEFINICIÓN		
		CONCEPTUAL	DIMENSION	INDICADOR
¿Los factores sociales inciden en el consumo de drogas en adolescente gestantes del Centro Materno Infantil Venus de Valdivia?	Factores sociales	Los factores sociales significan cómo las relaciones, las características demográficas y las estructuras sociales, como la cultura y el entorno	Condiciones socioeconómicas	Alta Media baja
			Exposición a factores de riesgo Sucesos estresantes de vida	Encuesta
			Estilo de vida	
			Educación	Primaria Secundaria Tercer nivel Cuarto nivel
			Relaciones sociales	Familiares Amigos Compañeros de trabajo

Elaborado por: Yagual Lino Marlene de los Ángeles



## **CAPÍTULO III**

### **6. Diseño metodológico**

#### **6.1. Tipo de investigación**

Es un estudio de tipo descriptivo, porque se busca especificar características de personas, su estilo de vida, su relación con el entorno donde viven, sus hábitos sus costumbres, sus condiciones sociales entre otros factores que incidan al consumo de drogas en las adolescentes gestantes. Es decir, pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (MSP, 2020).

Es un estudio de tipo analítico porque realizaremos comprobación de hipótesis determinando estado de salud de las adolescentes gestantes y los posibles factores causales (Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, 2020).

Se considera también una investigación transversal porque el trabajo investigativo se realizará en un tiempo específico y la aplicación del instrumento será en una sola oportunidad en las adolescentes gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Venus de Valdivia.

#### **6.2. Métodos de investigación**

**Método Cualitativo:** Se basa en la recopilación de información que permita determinar y describir cuáles son los factores de riesgos sociales que más inciden en el consumo de drogas, además también nos permite analizar y detallar las consecuencias que tienen en la salud de las adolescentes gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Venus de Valdivia.

#### **6.3. Población y muestra**

Población. - Está constituido por el Centro de Salud Materno Infantil Venus de Valdivia

Muestra: Está constituido 63 adolescentes gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Venus de Valdivia, de las cuales tenemos según rango de edades 13 adolescentes entre de 12 a 15 años, 23 de 16 a 17 años y 27 de 18 a 19 años.

#### **6.4. Tipos de muestreo**

El tipo de muestreo que se va a utilizar es un muestreo no probabilístico ya que este tipo de muestreo permite al investigador seleccionar la muestra según su criterio, en este caso lo que se pretende es determinar cuáles son los factores sociales que inciden en el consumo de drogas en adolescentes gestantes.

#### **6.5 Técnicas recolección de datos**

La observación directa es una herramienta que nos permite recabar información desde una perspectiva holística ya que nos permite ver cómo es la vida de las adolescentes gestantes, como es su comportamiento, como se relaciona con su entorno, como es su apariencia física, sus signos vitales y su estado de salud a nivel general.

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa y cuantitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar ya que lo que buscamos es ver el progreso del estado de salud del paciente mediante la aplicación del proceso de atención de enfermería.

La recopilación documental, mediante proyectos de investigación registrados en las plataformas digitales de temas relacionados a mi problema a de investigación me permiten implementar un proceso sistemático de análisis de información para alcanzar un objetivo específico, que se desarrolla a través de metodologías y técnicas tomando en cuenta los recursos disponibles y la situación actual del mundo debido al problema del Covid -19.

#### **6.6. Instrumentos de recolección de datos**

En la investigación, la encuesta se considera en primera instancia como un instrumento de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera ordenada sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente construida.

Las revistas e información de internet son fundamentales para recabar información relacionada con mi problema de investigación y además me permiten obtener datos oficiales y actuales que le permitan dar un enfoque científico y deductivo a mi investigación.

Registro de historia Clínica es un instrumento fundamental en este tipo de investigaciones porque nos permite ver el estado de salud del paciente, ver sus antecedentes personales, si tiene patologías que comprometan su salud o si es alérgico a alguna medicación, es prácticamente una herramienta ideal para de ahí poder brindar los cuidados de enfermería al paciente.

### **6.7. Aspectos éticos**

Las consideraciones éticas de este proyecto de investigación están fundamentadas en los principios bioéticos como son: beneficencia, no maleficencia. También se considerará la confidencialidad y el consentimiento informado como unas herramientas muy importantes que nos permitirán tomar como objeto de estudio al individuo previa a la autorización del mismo.

Consentimiento informado: es un documento de procedimiento formal y exigencia ética que se presentó al involucrado, donde expresa la libre voluntad de las adolescentes gestantes que consumen drogas de participar en la investigación.

Confidencialidad: En este punto se guarda absoluta reserva de la información brindada por los adolescentes gestantes que consumen drogas, este principio aporta al presente trabajo de investigación datos relevantes para el respectivo análisis, además de las posibles soluciones para este grupo vulnerable.

Beneficencia: este principio ayudara a los adolescentes gestantes que consumen drogas a preservar y cuidar su salud mediante una correcta prevención por parte del personal de enfermería indicándole las pautas necesarias para que puedan mantener su propio autocuidado, dejando a un lado el consumo de drogas.

No maleficencia: Este principio de gran importancia en el proceso de la investigación, quien además se trata de no dañar de forma física, social, mental y psicológica a las adolescentes gestantes que consume drogas y de esta manera evitar la imprudencia y cuidar la integridad del entrevistado para no lastimar a nadie.

## CAPÍTULO IV

### 7. Presentación de resultados

#### 7.1 Análisis e interpretación de resultados

De acuerdo al primer objetivo planteado acerca de Caracterizar la población de adolescentes gestantes que consumen drogas según rangos de edad y tiempo de consumo.

#### Gráfico 1

*Edad de inicio en el consumo de drogas*



Elaborado por: Yagual Lino Marlene.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia.

#### Análisis

Se pudo evidenciar en el gráfico 1 que el rango de edad de 13 a 15 años es el que predomina con un 43% en cuanto al inicio de consumo de drogas en las adolescentes gestantes y en un menor porcentaje tenemos con un 21% adolescentes entre 10 a 12 años, lo que nos pone de manifiesto el peligro que existe a tan temprana edad de adolescentes inmersas en el consumo de drogas y más aún si están en etapa de gestación, porque ponen más en riesgo su vida y la del feto.

## Gráfico 2

*Frecuencia de consumo en los últimos 3 meses*



Elaborado por: Yagual Lino Marlene.


Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia.

### Análisis

Este gráfico nos revela la frecuencia de consumo de drogas de las adolescentes gestantes en los últimos 3 meses donde se obtuvieron los siguientes resultados; 30% consume cocaína de 4 a 5 veces a la semana, seguido de heroína con un 25 % que lo realizan de 9 a 10 veces al mes, con un 21% la marihuana de 4 a 5 veces a la semana, lo que nos lleva al análisis de que las drogas se están apoderando cada vez más desde temprana edad y con mayor frecuencia sin importar las condiciones en que se presenten en las adolescentes.

### Gráfico 3

*Frecuencia de los deseos o ansias por consumir sustancias tóxicas tienen las adolescentes gestantes en los últimos 3 meses*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por;  
[file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

#### Análisis

Este gráfico nos revela la frecuencia de los deseos o ansias que tienen las adolescentes gestantes por consumir drogas donde tenemos los siguientes resultados con el 33% tenemos a la cocaína como principal sustancia que desean consumir, con un 21% la heroína y con un 17% el tabaco, lo que nos lleva a la conclusión de que estas son las principales sustancias por las que las adolescentes tienen muchas ansias por consumir.

El segundo objetivo acerca de identificar los factores de riesgo sociales que más inciden en el consumo de drogas en las adolescentes gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Venus de Valdivia.

#### **Gráfico 4**

*Factor social que más incide en el consumo de drogas*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\_spanish.pdf

**Análisis**

Este gráfico nos demuestra cual es el factor social que más incide en el consumo de drogas en las adolescentes gestantes, entre los resultados tenemos con un 44% a los problemas familiares y con un 38% a maltrato familiar y con un menor porcentaje con un 17% a problemas económicos, lo que nos lleva a la conclusión de que los problemas familiares son los factores que más inciden en el consumo de drogas.

## Gráfico 5

*Factores de riesgo que consideras UD que inciden en el consumo de drogas*



Elaborado por: Yagual Lino Marlene.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia.

### Análisis


Tenemos con un 33% a la depresión por relaciones sentimentales, con un 30% la mala relación con los padres, con un 21% la falta de interés de los padres por conocer el entorno que rodean a sus hijos y en un menor porcentaje tenemos con un 16% el hecho de sobresalir en el grupo de amigos. Todos estos factores de riesgo son los principales causantes de que las adolescentes gestantes se conviertan en consumidoras y pongan en riesgo su vida y salud.



En relación al tercer objetivo acerca de relacionar factores de riesgo sociales por consumo de drogas con las complicaciones materno fetales que presentan las adolescentes gestantes del Centro de Salud Materno Infantil Venus de Valdivia

### Gráfico 6

#### *Complicaciones materno-fetales*



Elaborado por: Yagual Lino Marlene.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia.

#### Análisis

Podemos evidenciar en el gráfico 19 las series de complicaciones en relación a los factores de riesgo por consumo de drogas, en las adolescentes gestantes entre las complicaciones más relevantes tenemos con un 27% a deformidades en las extremidades, con un 22% a desprendimiento de placenta y placenta previa, con un 21% a anomalías del sistema nervioso central y periférico, 17% al retraso en el crecimiento intrauterino y en una menor cantidad con un 13% aborto espontaneo.

## Gráfico 7

*Cuál es el riesgo que corre una persona que consume*



Elaborado por: Yagual Lino Marlene.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia.

### Análisis

Este gráfico nos permite conocer el riesgo que corre las adolescentes gestantes en su salud por el consume de drogas entre los principales tenemos con un mayor porcentaje 33% trastornos psiquiátricos y en un menor porcentaje trastornos alimentarios. Lo que nos lleva al análisis de que si no se realizan los correctivos necesarios a las adolescentes gestantes podrían sufrir consecuencias graves a futuro tanto para ella como para el bebe.

## 7.2 Conclusiones

De acuerdo a los objetivos planteados se llegó a la conclusión que existen varios factores sociales que inciden en el consumo de drogas en adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia, dentro de los cuales se logró determinar los rangos de edad y tiempo de consumo de drogas en el que viven las adolescentes gestantes, la edad de 13 a 15 años es la que predominó con un 43% de las adolescentes encuestadas, en cuanto al inicio de consumo de drogas en las adolescentes gestantes y en un menor porcentaje tenemos con un 21% adolescentes entre 10 a 12 años.

En cuanto al tiempo de consumo pudimos determinar que, en los últimos 3 meses, el consumo de cocaína lo realizaban de 4 a 5 veces por semana siendo este el porcentaje más alto con un 30%, lo que nos pone de manifiesto el peligro que corren a temprana edad sin saber el riesgo y peligro que ponen en juego tanto para la salud de ellas como para la salud del bebé.

En cuanto a la identificación de los factores de riesgo sociales que más inciden en el consumo de drogas, logramos determinar que un 33% representa que la depresión por relaciones sentimentales es la causa con mayor relevancia que incide a que las adolescentes consuman drogas, con un 30% la mala relación con los padres, un 21% la falta de interés de los padres por conocer el entorno que rodean a sus hijos y con un 16% el hecho de querer sobresalir o llamar la atención en el grupo de amigos. Todos estos factores de riesgo son los principales causantes de que las adolescentes gestantes se conviertan en consumidoras y pongan en riesgo su vida y su salud.

En relación al tercer objetivo planteado acerca de la relación que hay entre las complicaciones materno fetales y los factores de riesgo que inciden en el consumo de drogas logramos determinar que efectivamente existe una relación estrecha tanto así que debido a los factores de riesgo es que se pueden desarrollar las siguientes complicaciones en las adolescentes gestantes que no llevan un control, pueden ocasionarle al bebé: 27% de deformidades en las extremidades, además la adolescente puede presentar; un 22% de desprendimiento de placenta y placenta previa, un 21% anomalías del sistema nervioso central y periférico, 17% retraso en el crecimiento intrauterino y en una menor cantidad con un 13% aborto espontáneo.

### **7.3 Recomendaciones**

Se recomienda que no solo se dé énfasis a los factores sociales, sino que este proyecto de investigación sirva de ejemplo para que futuras investigación hagan énfasis a los diversos factores que existen tanto en lo cultural como psicológico ya que también son de mucha importancia para que las adolescentes gestantes cambien sus hábitos y puedan seguir un tratamiento oportuno para cuidar de su salud y la de su bebe.

En cuanto a la identificación de los factores que riesgo que más incidencia tuvieron podemos recomendar que si efectivamente se necesita de hacer una buena prevención en cuanto a determinantes de salud que incidan en el consumo de drogas en adolescentes, ya que estos factores son modificables y se pueden ser manejados de una forma muy positiva para las adolescentes, es ahí donde el papel del profesional de enfermería cobra gran importancia ya que es quien debe fomentar la promoción y prevención en salud. Además, no solo el profesional de enfermería debe encargarse de estas problemáticas sino todo el equipo de salud incluyendo psicólogos

En relación a las complicaciones materno fetales que se presentan producto del consumo de drogas podemos recomendar que se dé seguimiento a las gestantes adolescentes para que no descuiden sus controles prenatales y de esta manera puedan estar en constante valoración médica para ver si el feto no corre el riesgo de tener complicaciones a futuro y a su vez orientar a la adolescente a que deje de consumir drogas y hacerle concientizar sobre las consecuencias que podría tener si no deje esas sustancias.

## 8. Referencias bibliográficas

- Diez, M., & Pawlowicz, M. (2020). Entre la invisibilidad y el estigma: consumo de sustancias psicoactivas en mujeres embarazadas y puérperas de tres hospitales generales de Argentina. *Scielo Salud Publica*, 2,3. Obtenido de <https://scielosp.org/article/scol/2020.v16/e2509/es/>
- Waly, G. (30 de junio de 2020). *Informe mundial sobre las drogas 2020*. Obtenido de Dianova: <https://www.dianova.org/es/noticias/informe-mundial-sobre-las-drogas-2020/>
- Acosta. (2017). CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS. *Consumo de drogas*. Obtenido de <http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/4555/3/%E2%80%9CCONSUMO%20DE%20DROGAS%20EN%20ADOLESCENTES%20EMBARAZADAS%20Y%20SUS%20EFECTOS%20EN%20LA%20MADRE%20Y%20EL%20RECI%20NACIDO-A%20%281%29.pdf>
- Allen, B. (21 de mayo de 2019). *healthychildren.org*. Obtenido de healthychildren.org: <https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stages-of-Adolescence.aspx>
- Barahona, G. (2018). *COMPLICACIONES MATERNO FETALES EN GESTANTES DROGODEPENDIENTES, EN PACIENTES ENTRE 16 Y 20 AÑOS DE EDAD* . Guayaquil: repositorio universidad de guayaquil.
- Betanco, F. (2017). Los factores que influyen en la drogadicción de los jóvenes y su. *REVISTA CIENTIFICA DE FAREM-ESTELI*, 3-5. Obtenido de <https://repositorio.unan.edu.ni/5087/1/17834.pdf>

Briones, L. W., Hidalgo, L. H., Alvarado, L. J., Noy, L. E., & Vázquez, L. A. ((2018)).

Causas de las adicciones en adolescentes y jóvenes en Ecuador. *scielo*, 3.

Obtenido de

[http://scielo.sld.cu/?url=http%3A%2F%2Fscielo.sld.cu%2Fscielo.php%3Fscript%3Dsci\\_arttext%26pid%3DS1025-02552018000200003](http://scielo.sld.cu/?url=http%3A%2F%2Fscielo.sld.cu%2Fscielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS1025-02552018000200003)

Clinic, M. (2018). Drogadiccion, consumo de sustancias psicoactivas. *Mayo Clinic*.

ECUADOR. (2018). *CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR*.

ECUADOR.

Gaitán, D. E. (2019). Factores para un embarazo de riesgo. *Revista Médica Sinergia*, 1.

Obtenido de

<https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/319/664>

HURTADO, G. L., CUMBICO, K. P., & MSC., D. C. ((2018)). Consecuencias materno perinatal y determinantes psicosociales por el uso de sustancias psicoactivas en embarazadas primigestas de 15 a 19 años atendidas en el hospital matilde idalgo de procel. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/31771/1/CD-518%20Casquete%20Hurtado%2C%20Geraldine%3B%20Rodriguez%20Cumbico%2C%20Katherine.pdf>

Ley, O. (2018).

Londoño, J. (2016). Complicaciones en la madre, feto y neonato, derivadas del consumo de cocaína durante la gestación. *redalyc.org*, 24-31. Obtenido de

<https://www.redalyc.org/journal/1590/159047933004/html/>

López, L., & Cruz, C. (2018). Factores psicosociales y sociodemográficos vinculados al uso de sustancias psicoactivas en mujeres durante el embarazo. Una revisión

narrativa. *Revista Internacional de Investigación en Adicciones.*, 4,5. Obtenido de <http://riiad.org/index.php/riiad/article/view/riiad.2017.2.06/230#toc>

Lopez, S. (2017). *Embarazo en mujeres consumidoras de drogas* . Guayaquil: Repositorio de la universidad de guayaquil.

López-Granados, L. M. ((2017)). Factores psicosociales y sociodemográficos vinculados al uso de sustancias psicoactivas en mujeres durante el embarazo. Una revisión narrativa. 3. Obtenido de <http://riiad.org/index.php/riiad/article/view/riiad.2017.2.06/230>

Mayo, C. (21 de mayo de 2020). *Mayo Clinic*. Obtenido de Mayo Clinic: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/drug-addiction/symptoms-causes/syc-20365112>

Menéndez, X. (2018). Sustancias adictivas y embarazo: Cuidado de enfermería en mujeres embarazada y al recién nacido para minimizar sus efectos. *Enfermería comunitaria, revista de seapa*, 1. Obtenido de [file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-SustanciasAdictivasYEmbarazo-6490892%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-SustanciasAdictivasYEmbarazo-6490892%20(5).pdf)

Ministerio de Salud Pública (2020). *Estudio de caso de alcance descriptivo*. Ecuador: PRIMERO. Obtenido de [https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/12/Anexo-1\\_Estudio-de-Caso-con-Alcance-descriptivo.pdf](https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/12/Anexo-1_Estudio-de-Caso-con-Alcance-descriptivo.pdf)

Montoya, M. (2019). *Factores Psicosociales y Familiares de las Adolescentes Embarazadas atendidas en el Hospital María Auxiliadora*. lima: Repositorio Univerdidad Nacional Federico Villareal.

- Murillo , J. (2019). *FACTORES DE RIESGO PARA EL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO*.  
Guayaquil: Repositorio Universidad de Guayaquil.
- Naciones , U. (2018). Organizacion del fondo de Naciones Unidas.
- Norma C. Aguirre-Guiza, O. B.-P.-I. ((2017)). Factores familiares de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas . 2. Obtenido de  
<http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v19n1/0124-0064-rsap-19-01-00021.pdf>
- OMS. (2018). tabaquismo. *Organizacion Mundial de la Salud*.
- OPS. (2018). *Efectos sociales y para la salud del consumo de cannabis sin fines médicos*.
- Organizacion, M. (27 de junio de 2018). *Organizacion, Mundial de la Salud*; Obtenido de Organizacion, Mundial de la Salud;;  
<https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud>
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *Revista científica Scielo*, 230. Obtenido de  
<https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf>
- Quizhpi. (2019). *CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y SUS EFECTOS EN LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO-A*". MILAGRO: REPOSITORIO UNEMI.
- Recal, F. (2018). Adiccion. *Fundacion Recal*.
- RENATA, G. P. (s.f).



Salud, S. A. (29 de SEPTIEMBRE de 2019). *Servicio Andaluz de Salud*. Obtenido de Servicio Andaluz de Salud:

<https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/el-sas/servicios-y-centros/adicciones/preguntas-frecuentes-adicciones/definicion-causas-y-consecuencias>

Samaniego, S. (2017). *FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS POR ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 14-19 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL DRA. MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL DESDE JUNIO DEL 2015*. Guayaquil: repositorio de la Universidad de Guayaquil. Obtenido de

<http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/48205/1/CD%20350-%20SAMANIEGO%20ALCIVAR%20SANDRA%20CAROLINA.pdf>

Tena-Suck, A., Castro-Martínez, G., Marín-Navarret, R., & Gómez-Romero, P. ((2018)). Consumo de sustancias en adolescentes: consideraciones para la práctica médica. 3. Obtenido de

[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0186-48662018000200008&lang=pt](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-48662018000200008&lang=pt)

Ureña. (2018). Efectos tóxicos del consumo. Las drogas en la gestación. *PARANINFORMACIÓN DIGITAL*. Obtenido de <http://www.index-f.com/para/n28/e113.php>.

Welintong, T. (2017). *FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE DROGAS. ADOLESCENTES DE BACHILLERATO. UNIDAD EDUCATIVA DR. LUIS CÉLLERI AVILÉS 2017*. santa elena: repositorio UPSE.

## 9. Anexos

### Permiso del Distrito de Salud



Facultad de  
Ciencias Sociales y de la Salud  
Enfermería

Oficio N° 620-CE-UPSE-2021  
La Libertad, 07 de septiembre de 2021

Señora Doctora  
Wendy Cochea Perero  
**DIRECTORA DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD – SALINAS SALUD**  
En su despacho. –

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de parte de quienes conformamos la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.

La presente es para comunicar a usted que, en sesión de Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, fue aprobado el tema para el desarrollo del trabajo de investigación previa a la obtención al título de Licenciada en Enfermería a la estudiante:

N°	TÍTULO	ESTUDIANTE	
		NOMBRE	CEDELA
1	FACTORES SOCIALES QUE INCIDEN EN EL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES GESTANTES CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL VENUS DE VALDIVIA, 2020.	YAGUAL LIND MARLENE DE LOS ANGELES	0927515379

Por lo antes expuesto, solicito a usted se sirva autorizar el ingreso a las áreas correspondientes para que la Srta. Yagual Marlene, proceda al levantamiento de información dentro de la institución a la cual usted dignamente representa, a fin de desarrollar el trabajo de investigación antes indicado.

Por la atención que se sirvan brindar a la presente, reitero a ustedes mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



ALICIA CERCADO  
CERCADO MANCERO

Lic. Alicia Cercado Mancero, PhD.  
**DIRECTORA CARRERA DE ENFERMERÍA**



Cc: Dra. Johanna Espinoza Andrade - DIRECTOR CENTRO DE SALUD VENUS DE VALDIVIA  
Atento  
Alicia

Dirección: Campus Marino, La Libertad, provincia Santa Elena - Ecuador  
Código Postal: 240201 - Teléfono: (593) 2-381132  
www.upse.edu.ec



**Coordinación Zonal 5 – Salud**  
**Dirección Distrital 24D02 La Libertad – Salinas Salud**

**Oficio Nro. MSP-CZS5-SE-24D02-2021-0669-O**

**Salinas, 13 de septiembre de 2021**

**Asunto:** RESP// UPSE-ENFERMERIA - Solicitud de autorización para realizar trabajo de titulación en el Centro de Salud Venus de Valdivia - MA.A.YA.L.

Directora Carrera de Enfermería - U.p.s.e.  
Alicia Gabriela Cercado Mancero  
**UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA**  
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba cordiales saludos de la Dirección Distrital 24D02 La Libertad - Salinas Salud.

Por medio del presente y en atención a su Oficio N° 620-CE-UPSE-2021, mediante el cual solicita se emita la autorización para el ingreso a las áreas correspondientes para el levantamiento de información a estudiante YAGUAL LINO MARLENE DE LOS ANGELES, a fin de desarrollar trabajo de investigación previo a la obtención de título de licenciada en enfermería en el Centro de Salud Venus de Valdivia.

Al respecto a través de la unidad distrital de Provisión y Calidad de los Servicios de Salud, se informa que toda vez revisada la normativa legal, se determina que existe un convenio entre la Universidad Estatal Península de Santa Elena y el Ministerio de Salud Pública, por lo cual es procedente la autorización para acceder a información para trabajo de titulación bajo las siguientes condiciones:

1. La recopilación de información no podrá bajo ninguna circunstancia alterar o interrumpir los procesos asistenciales del establecimiento de salud.
2. El estudiante deberá llevar su propia mascarilla y alcohol para higiene de manos (Y equipo de protección en caso de que requiera).
3. La información debe ser manejada con la confidencialidad que el caso lo requiera

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Dirección: Av. Carlos Espinoza Larrea, Edificio CAC, Planta Baja, Ofic. 8 y 9  
Código Postal: 240205 / Salinas – Santa Elena – Ecuador  
Teléfono: 593 (4) 3706-623 – [www.salud.gob.ec](http://www.salud.gob.ec)

\* Documento firmado electrónicamente por Gupia

 **Gobierno** Juntos lo logramos  
del Encuentro

1/2



**Coordinación Zonal 5 – Salud**  
**Dirección Distrital 24D02 La Libertad – Salinas Salud**

**Oficio Nro. MSP-CZSS-SE-24D02-2021-0669-O**

**Salinas, 13 de septiembre de 2021**

Atentamente,



**Documento firmado electrónicamente**

Mgs. Wendy Esmeralda Cochea Perero  
**DIRECTORA DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD - SALINAS SALUD**

Referencias:

- MSP-CZSS-SE-24D02-PCSS-2021-0501-M

Anexos:

mop-czs5-se-24d02-vssu-2021-1034-e\_upse\_enfermeria\_solicitud\_autorizacion\_trabajo\_de\_titulacion.pdf

Copia:

Señora Doctora  
Johanna Elizabeth Espinoza Andrade  
**Administradora Técnica del Centro de Salud Tipo C Venus de Valdivia**

Señor Doctor  
Jose Alberto Zambrano Moreno  
**Responsable Distrital de Provisión y Gestión de la Calidad de Servicios de Salud**

Señor Licenciado  
Jonathan Javier Gabino Ornela  
**Responsable de Ventanilla Única de Atención al Usuario, Encargado**

*Handwritten signature and date: 24/09/21*



WENDY ESMERALDA  
COCHEA PERERO

Dirección: Av. Carlos Espinoza Larrea, Edificio CAC, Planta Baja, Ofic. 8 y 9  
Código Postal: 240205 / Salinas – Santa Elena – Ecuador  
Teléfono: 583 (4) 3706-623 – www.salud.gob.ec

**Gobierno** Juntos lo logramos  
al Encuentro

## Tablas y gráficos

**Tabla 7**

*A lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez?*


Sustancias tóxicas	Cantidad	Porcentaje
Bebidas alcohólicas	31	49%
Cannabis	5	8%
Cocaína	9	14%
Tranquilizantes o pastillas para dormir	3	5%
Heroína, metadona, codeína, morfina	7	11%
Tabaco	6	10%
Total	63	100%

**Nota:** Esta tabla muestra las sustancias que las adolescentes gestantes han consumido a lo largo de su vida, elaborado por: Marlene Yagual Lino.

**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

**Gráfico 7**

*Sustancias que las adolescentes gestantes han consumido en su vida*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

### Análisis

En el presente gráfico se evidencia que a pesar de que el consumo de bebidas alcohólicas tiene un 49% existen porcentajes a considerar del consumo de cocaína con un 14% y el consumo de heroína con un 11%, lo que nos pone a analizar que si existe un porcentaje considerable de consumo de drogas en las adolescentes gestantes lo cual preocupa debido al estado en que se encuentran y el peligro que ponen a su vida y a la del feto.

## Tabla 8

*Con qué frecuencia ha consumido drogas en los últimos tres meses*


Sustancias tóxicas	1 a 2 veces al Día	4 a 5 veces a la Semana	9 a 10 veces al Mes	Porcentaje
Bebidas alcohólicas			5	8%
Cannabis		13		21%
Cocaína		19		30%
Tranquilizantes o pastillas para dormir	3			5%
Heroína, metadona, codeína, morfina			16	25%
Tabaco		7		11%
Total	3	39	21	100%

**Nota:** Esta tabla muestra la frecuencia de consumo de sustancias tóxicas en los últimos 3 meses, elaborado por: Marlene Yagual Lino.

**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

## Gráfico 8

*Frecuencia de consumo de sustancias tóxicas en los últimos 3 meses*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

### Análisis

El presente gráfico nos demuestra la frecuencia de consumo de drogas que han tenido las adolescentes gestantes en los últimos 3 meses en los cuales tenemos con un 30% al consumo de cocaína de 4 a 5 veces por semana seguido del consumo de heroína con un 25% y con un 21% el consumo de marihuana.

**Tabla 9**

*En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia le ha llevado su consumo de drogas a problemas de salud, sociales, legales o económicos*


Sustancias tóxicas	1 a 2 veces al Día	4 a 5 veces a la Semana	9 a 10 veces al Mes	Porcentaje
Bebidas alcohólicas	4			6%
Cannabis		5		8%
Cocaína			23	37%
Tranquilizantes para dormir		7		11%
Heroína, metadona			15	24%
Tabaco		9		14%
Total	4	21	38	100%

**Nota:** Esta tabla muestra la frecuencia de problemas en la salud, social, legal o económicos que le ocasionan el consumir sustancias tóxicas en los últimos 3 meses, elaborado por: Marlene Yagual Lino.

**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

**Gráfico 9**

*Frecuencia de problemas en la salud, social, legal o económicos que le ocasionan el consumir sustancias tóxicas en los últimos 3 meses*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

#### Análisis

Este gráfico nos revela la frecuencia de problemas en salud, social, legal o económico que les ocasionan el consumo de drogas a las adolescentes gestantes, donde con un 37% tenemos a la cocaína como principal causante, luego la heroína con un 24% y al tabaco con un 14%, lo que nos lleva al análisis de que estas son las drogas principales que causan problemas en la salud en las adolescentes gestantes.

**Tabla 10**

*Con quién vives actualmente en tu hogar*

	Cantidad	Porcentaje
Papa	19	30%
Mama	21	33%
Hermanos	7	11%
Abuelos	5	8%
Padrasto o Madrastra	11	17%
Total	63	100%

**Nota:** Esta tabla muestra con quien vive la adolescente gestante, elaborado por: Marlene Yagual Lino.

**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por;  
[file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

**Gráfico 10**

*Este gráfico muestra con quien vive la adolescente gestante*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por;  
[file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

### Análisis

Este gráfico nos demuestra con quien vive la adolescente gestante en su hogar donde tenemos los siguientes resultados con un 33% viven con la mama y un 30% con el papa, un 17 % viven con padrasto o madrastra, un 11% con los hermanos. Lo que nos lleva al análisis que más viven con la mama las adolescentes gestantes y a pesar de eso hacen caso omiso a los consejos y orientación que les brindan.



**Tabla 11**

*Hablando sobre drogas en general ¿En qué medidas crees que son peligrosas?*

	Cantidad	Porcentaje
Nada peligrosas	7	11%
Poco peligrosas	11	17%
Muy peligrosas	45	71%
Total	63	100%

**Nota:** Esta tabla muestra en qué medida creen que la drogas son peligrosas, elaborado por: Marlene Yagual Lino.

**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

**Gráfico 12**

*En qué medida crees que son las drogas peligrosas*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

### Análisis

El siguiente gráfico nos revela el conocimiento que tienen las adolescentes gestantes para poder identificar en que medidas son peligrosas las drogas donde los resultados obtenidos fueron con un 71% de las adolescentes respondieron que son muy peligrosas, con 17% que son poca peligrosas, y un 11% que no son peligrosas, lo que nos lleva a la conclusión que a pesar de tener el conocimiento de lo peligrosas que son igual siguen consumiendo drogas.

**Tabla 12**

*En tu opinión cuál es la droga más peligrosa*

	Cantidad	Porcentaje
Alcohol	10	16%
Tabaco	8	13%
Cocaína	21	33%
Marihuana	13	21%
Heroína	11	17%
Total	63	100%


**Nota:** Esta tabla muestra cuál es la droga son peligrosas, elaborado por: Marlene Yagual Lino.

**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por;

[file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

**Gráfico 12**

*Cuál es la droga más peligrosa*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por;

[file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

## Análisis

Este gráfico nos revela cual es la droga más peligrosa que consideran las adolescentes gestantes que les causa daño, entre ella tenemos a la cocaína con un 33%, seguido de la marihuana con un 21% y la heroína con un 17%, lo que nos lleva al análisis que a pesar de tener el conocimiento de lo dañinas que son estas drogas igual las siguen consumiendo.

**Tabla 13**

*Has probado algún tipo de droga*

	Cantidad	Porcentaje
Si	37	59%
No	26	41%
Total	63	100%

**Nota:** Esta tabla muestra si las adolescentes gestantes han probado algún tipo de droga, elaborado por: Marlene Yagual Lino.

**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

**Gráfico 13**

*Las adolescentes gestantes han probado algún tipo de droga*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

### Análisis

Este gráfico nos revela si las adolescentes gestantes han consumido droga alguna vez, entre los resultados tenemos un 59% que si han probado algún tipo de droga mientras que el 41% manifiesta que no ha probado. Llegamos a la conclusión que existe un porcentaje considerable de adolescentes que han consumido drogas.

**Tabla 14**

*Cuál es el riesgo que corre una persona que consume drogas*

	Cantidad	Porcentaje
Trastornos Psiquiátricos	21	33%
Trastornos alimentarios	19	30%
Vivir en la calle	15	24%
Quedarse solo	8	13%
Total	63	100%

**Nota:** Esta tabla muestra el riesgo que corre una persona que consume droga, elaborado por: Marlene Yagual Lino.

**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

**Gráfico 14**

*Riesgo que corre una persona que consume droga*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

### Análisis

Este gráfico nos permite conocer el riesgo que corre las adolescentes gestantes en su salud por el consumo de drogas entre los principales tenemos con un mayor porcentaje 33% trastornos psiquiátricos y en un menor porcentaje 30% trastornos alimentarios. Lo que nos lleva al análisis de que si no se realizan los correctivos necesarios a las adolescentes gestantes podrían sufrir consecuencias graves a futuro tanto para ella como para el bebé.

**Tabla 15**

*En qué lugar te han ofrecido drogas*

	Cantidad	Porcentaje
Escuela o colegio	18	29%
Parque	8	13%
En la calle	23	37%
En reuniones o fiestas	14	22%
Total	63	100%

**Nota:** Esta tabla muestra el lugar donde te han ofrecido droga, elaborado por: Marlene Yagual Lino.  
**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por;  
[file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

**Gráfico 15**

*Lugar donde te han ofrecido droga*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por;  
[file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

### Análisis

Este gráfico nos revela el lugar donde le han ofrecido drogas a la adolescente gestante, entre los resultados obtenidos tenemos; con un 37% en la calle y con un 29% en la escuela o colegio, con un 22% en reuniones o fiestas, lo que nos lleva la conclusión de que la calle es el lugar principal donde la adolescente encuentra drogas.

**Tabla 16**

*En los miembros de tu familia existe alguien que consuma drogas*

	Cantidad	Porcentaje
SI	37	59%
No	26	41%
Total	63	100%

**Nota:** Esta tabla muestra si en los miembros de tu familia existe alguien que consuma drogas, elaborado por: Marlene Yagual Lino.

**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

**Gráfico 16**

*En los miembros de tu familia existe alguien que consuma drogas*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

### Análisis

Este gráfico nos demuestra si en la familia de la adolescente gestante existen personas que consumen drogas entre los resultados obtenidos tenemos con un 59% que si existen personas que consumen drogas y un 41 % que no consumen drogas, lo que nos lleva la conclusión que al ver que existen familias donde hay personas que consuman drogas es lógico que la adolescente va a consumir drogas en cualquier momento.

**Tabla 17**

*Tus padres te permiten o permitirían fumar*

	Cantidad	Porcentaje
Si en cualquier sitio	19	30%
Sí, pero no en casa	11	17%
No te lo permitiría	33	52%
Total	63	100%

**Nota:** Esta tabla muestra si tus padres te permiten fumar, elaborado por: Marlene Yagual Lino.

**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por;  
file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\_spanish.pdf

**Gráfico 17**

*Tus padres te permiten fumar*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por;  
file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\_spanish.pdf

### Análisis

El siguiente gráfico nos revela si los padres le permiten a sus hijos fumar donde el 52% de las adolescentes encuestados manifestaron que no les permitirían mientras que el 30% manifestó que si les permiten pero en cualquier otro sitio que no se en casa, lo que nos lleva la conclusión de que existe una gran libertad para que las adolescentes puedan fumar por ello desde ahí radica el problema por quizás pueden empezar a fumar tabaco pero después terminaran consumiendo alguna droga.

**Tabla 18**

*Qué importancia tiene para ti tu cuidado y nivel de salud*


	Cantidad	Porcentaje
Nada importante	9	14%
Poco importante	23	37%
Muy importante	31	49%
Total	63	100%

**Nota:** Esta tabla muestra la importancia que tiene para UD. Su cuidado y su salud, elaborado por: Marlene Yagual Lino.

**Fuente:** Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

**Grafico 18**

*Qué importancia tiene para UD. Su cuidado y su salud.*



Elaborado por: Marlene Yagual Lino.

Fuente: Adolescentes gestantes del Centro de Salud Venus de Valdivia Citado por; [file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist\\_spanish.pdf](file:///C:/Users/CEVALLOS/Downloads/assist_spanish.pdf)

### Análisis

Este gráfico nos revela la importancia que consideran que tienen el cuidado y la salud las adolescentes gestantes en las cuales respondieron lo siguiente con un 49% consideran muy importante el cuidado y la salud de los adolescentes gestantes y el 37% consideran poco importante estos temas.